

PK FERTILIZER

磷鉀鎂

0-10-30+6%MgO

(顆粒狀)

台灣地處亞熱帶氣候區，夏季時高溫多濕，日照時間長，此時植物本身生長的速度及對土壤養分的吸收效率亦是最高的時候，這個時候就必須適量的增加磷鉀肥的使用量。

而某些特定植物（甜柿、葡萄、梨子、枇杷、桃子等）此時正處於生理落果期、果實肥大期、花芽分化期，急需要降低氮肥的供應量，另一方面也要增加磷鉀肥的使用量來抑制新梢徒長、防止生理落果、幫助果實肥大、促進花芽分化，這個時候磷鉀鎂肥料就是最好的選擇。

磷鉀鎂的成分：

全 磷	10.0 %
全氧化鉀	30.0 %
氧化鎂	6.0 %

磷鉀鎂的使用方法：

- 甜柿：1. 可於開花前後使用磷鉀鎂，防止生理落果發生。
2. 套袋後使用磷鉀鎂，可促進果實肥大、防止軟果。
- 桃子：可於中果期（硬核後）使用磷鉀鎂，防止軟尾的現象，並可減少樹體流膠的發生，還可抑制新梢過度生長，促進花芽分化及形成。
- 葡萄：可於果實種子硬化後使用磷鉀鎂來幫助果實肥大、果粒均勻、果實著色鮮豔、甜度提高、防止水傷及腐爛，延長的葡萄採收後的儲藏時間。
- 梨子：可於採收前 35-45 天使用磷鉀鎂，幫助果實肥大、果粒均勻、甜度提高、防止水傷及腐爛、延長果實採收後的儲藏時間。
- 瓜、豆雜作類：可於採收期使用磷鉀鎂，防止過度生長，增加產量。



包裝：20 公斤、袋裝

使用量：每分地使用量約 40~60 公斤。