

PK FERTILIZER

高磷鉀

0-25-25

(顆粒狀)

果實肥大、催花專用

為何要使用高磷鉀：

台灣地處亞熱帶氣候區，夏季時高溫多濕，日照時間長，此時植物本身生長的速度及對土壤養分的吸收效率亦是最高的時候。

而某些特定植物（葡萄、梨子、枇杷、桃子等）此時發育正處於果實肥大期或花芽分化期，需要降低氮肥的供給來抑制徒長，同時另一方面也要增加磷鉀肥的供應量來幫助果實肥大、著色鮮豔、甜度提高及幫助花芽分化，這個時候高磷鉀肥料就是最好的選擇。

高磷鉀的成分：

全 磷	25.0 %
全氧化鉀	25.0 %

高磷鉀的使用方法：

枇杷：可於套袋後及採收後（國曆 6-7 月）使用高磷鉀來抑制徒長，幫助花芽分化及促進花苞形成。

桃子：可於中果期及採收枝條修剪後（國曆 6-7 月）使用高磷鉀，來抑制新梢過度生長，促進花芽分化及形成，使其成為次年的結果枝。

葡萄：可於果實種子硬化後使用高磷鉀來幫助果實肥大、果粒均勻、果實著色鮮豔、甜度提高、防止水傷及腐爛，延長的葡萄採收後的儲藏時間。

梨子：可於採收前 35-45 天使用高磷鉀，幫助果實肥大、果粒均勻、甜度提高、防止水傷及腐爛、延長果實採收後的儲藏時間。

瓜、豆雜作類：可於採收期使用高磷鉀，防止過度生長，增加產量。



包裝：20 公斤、袋裝

使用量：每分地使用量約 40~60 公斤。